

La Arteriografía Meséntrica (04-05-1.999), una imagen de nódulo avascular, (aproximadamente 2 cm de diámetro), que rodea y desplaza vasos mesentéricos-intestinales, a nivel del yeyuno.

En la actualidad, el paciente presenta dolor crónico, ahora más acusado en raquis lumbar y sacroiliacas, en ocasiones es de tal intensidad, que le ocasionan cuadros vagales. El dolor es diurno y nocturno, y se acompaña de parestesias y rigidez vertebral.

Asimismo, refiere falta de concentración, dificultad para recordar hechos recientes, insomnio, fatiga y ánimo depresivo.

Sigue tratamiento farmacológico con:

- RENEURON 1 comp./día.
- TRYPTIZOL 50 mg. 3c./día.
- RIVOTRIL 20 gotas/día.
- NEURONTIN 300. 3c/día.
- 60 a 90 mg en solución extemporanea vía oral de Metadona.

Precisa para la deambulación una Ortesis lumbar y T.E.N.S. Sigue control con el Reumatólogo, y en la Clínica del Dolor, quienes aconsejan tratamiento de Electroshok.

El paciente presenta dificultad para la deambulación y ortostatismo prolongado, así como para desempeñar tareas de la vida diaria básicas, que suponen gran flexo extension de raquis y esfuerzo. Precizando la ayuda de una tercera persona.

#### VALORACION.

Las patologías descritas, son crónicas progresivas e irreversibles, explicando una sintomatología de difícil tratamiento, pro lo que consideramos que el paciente presente una muy severa limitación para el desempeño de toda actividad laboral.

Tarragona a, 9 de Septiembre de 1.999.

Dra. Elena REDAÑO XIPELL  
Especialista en Medicina del  
Trabajo. Colegiada núm. 18.780.